

Artelac® Nighttime Gel?

Artelac® Nighttime Gel yra akių gelis. 1 g produkto yra 2 mg karbomero, vidutinės grandinės trigliceridų, taip pat sterilaus vandens, sorbitolio ir natrio hidroksido. Cetrimidaz naudojamas kaip konservantas.

Kaip vartoti Artelac® Nighttime Gel?

Artelac® Nighttime Gel yra didelio klampumo visus tris ašarų plėvelės sluoksnius palaikantis gelis, užtikrinantis ilgalaikį akies paviršiaus drėkinimą ir apsaugą esant sausų akių pojūčiui.

Pavartojus Artelac® Nighttime Gel, iš pradžių matomas vaizdas būna miglotas, kol gelis pašalinamas mirksint, todėl daugelis žmonių vartoja šį produktą prieš miegą.

Kam skirtas Artelac® Nighttime Gel?

Artelac® Nighttime Gel geriausiai tinka norint suteikti papildomą apsaugą ašarų plėvelei, įskaitant labai svarbų paviršinį lipidų sluoksnį. Taip užtikrinamas maksimalus simptomų malšinimas ir drėgmės sulaikymas akies paviršiuje. Produktas sukelia raminamąjį poveikį akims ir kartu sulaiko drėgmę, taip ilgam panaikindamas sausumo pojūtį. Šis produktas puikiai tinka žmonėms, patiriantiems sausų akių simptomus, pavyzdžiui, nuovargį, įtampą, smėlio ir deginimo pojūčius ir (arba) pernelyg gausų ašarojimą. Šis produktas gali būti vartojamas kartu su kitais akių sausumą mažinančiais produktais siekiant papildomos apsaugos.




Akių sausumą sukelia:

- išoriniai veiksniai, ilgas naudojimas kompiuteriu, oro kondicionieriai, šildymas, cigarečių dūmai, vėjuotas oras ir kontaktiniai lęšiai;
- kiti veiksniai, pavyzdžiui, tam tikri vaistai (kontraceptinės tabletės, antihistamininiai preparatai, beta-blokatoriai, antispazminiai vaistai, šlapimo išsiskyrimą skatinantys vaistai) bei tam tikros ligos, skatinančios akių sausumą atsiradimą.

Kaip dažnai derėtų vartoti Artelac® Nighttime Gel?

Jei pageidaujate produktą vartoti naktį,lašinkite po vieną Artelac® Nighttime Gel gelio lašą į akį likus 15 min. iki miego, arba galite lašinti nuo 3 iki 5 ar daugiau lašų per dieną.

Kaip vartoti Artelac® Nighttime Gel?

	<p>1. Kaskart prieš vartodami, nuimkite apsauginį dangtelį nuo tūbelės galiuko</p>
	<p>2. Šiek tiek atloškite galvą, laisvos rankos pirštu truputį patraukite apatinį akies voką į apačią ir laikykite tūbelę vertikaliai virš akies, snapelį nukreipę į apačią. Tada švelniai suspauskite tūbelę ir išspauskite vieną gelio lašą.</p>
	<p>3. Kiekvieną kartą pavartoję produkto, vėl uždėkite dangtelį ant tūbelės.</p> <p>Užmerkite akį ir lėtai ją pasukinėkite, tada pamirksėkite, kad gelis optimaliai pasiskirstytų ant akies paviršiaus.</p>

Kada draudžiama vartoti Artelac® Nighttime Gel?

Nevartokite šio produkto, jei yra padidėjęs jautrumas kuriai nors iš jo sudedamųjų dalių.

Svarbi informacija apie Artelac® Nighttime Gel vartojimą?

- Retais atvejais šis produktas gali sukelti vietinę padidėjusio jautrumo reakciją. Tokiais atvejais nutraukite produkto vartojimą.
- Šis produktas gali laikinai sukelti miglotą matymą, kuris gali turėti neigiamos įtakos valdant mechanizmus ar vairuojant.
- Kad išvengtumėte sužeidimo, nelieskite akies tūbelės galiuku.
- Prieš pradėdami vartoti produktą, išimkite kontaktinius lęšius.
- Palaukite maždaug 15 minučių prieš vartodami kitą akims skirtą produktą ar prieš keisdami kontaktinius lęšius.
- Nelieskite akies paviršiaus tūbelės galiuku ar pirštais, nes galite užteršti tirpalą.
- Nevartokite produkto pasibaigus galiojimo laikui.
- Nevartokite produkto, jei tūbelė pažeista.

Kaip laikyti Artelac® Nighttime Gel?

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius produktą suvartoti per šešias savaites.

Pakuotė:

Artelac® Nighttime Gel tiekiamas 10 g tūbelėse.

Platintojas: UAB PharmaSwiss, Užnerio g. 1, 47484 Kaunas

®/™ yra „Bausch & Lomb Incorporated“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai.

www.artelac.lt

www.bausch.lt